

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g külsőleges oldatos spray

oktenidin-dihidroklorid/fenoxietanol



ENE

Mielőtt elkezdni alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

A gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtak, vagy kezelőorvosa, gyógyszerésze vagy a gondozását végző egészségügyi szakember által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Octicide 1 mg/g+20 mg/g külsőleges oldatos spray (továbbiakban Octicide) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Octicide alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Octicide-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Octicide-t tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Octicide és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Octicide fertőtlenítő (antiszeptikus) oldat helyi alkalmazásra. Korlátozott ideig ismételt alkalmazható a baktériumok és gombák elpusztítására, így a nyálkahártyák és a szomszédos bőrfelületek előkészítésére szolgál a külső nemi szerveket és a kiválasztó szerveket érintő műtéti beavatkozások és húgyhólyag-katéter bevezetése előtt, valamint sebek ismételt, rövid távú fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelése esetén.

Az Octicide készítményt legfeljebb 14 napig alkalmazza.

Orvosi előírás nélküli felhasználás:

Orvossal történő előzetes egyeztetés nélkül az Octicide alkalmazható gyermekek, serdülők és felnőttek felszíni sebeinek (például horzsolás, karcolás, apró vágások vagy égési sérülések és rovarcsípések) fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelésére.

Orvosi ajánlásra történő felhasználás:

Égési sérülések és nagyobb sebek rövid ideig tartó, ismételt kezelésére, valamint a hüvely és a szeméremajkak fertőtlenítő mosáshoz, illetve a pénisz makkjának fertőtlenítéséhez.

Orvos általi felhasználás:

A nyálkahártya és a szomszédos bőrfelületek fertőtlenítő előkezelése a külső nemi szervek és kiválasztó szervek környezetében végzett diagnosztikai vagy műtéti eljárás előtt, beleértve húgyhólyag-katéter bevezetését, valamint sebek ismételt, rövid távú, fertőtlenítő (antiszeptikus) kezelése.

2. Tudnivalók az Octicide alkalmazása előtt

Ne alkalmazza az Octicide-t:

- ha allergiás az oktenidin-dihidrokloridra, a fenoxietanolra vagy a gyógyszer (a 6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- Az Octicide közvetlenül a szemre nem alkalmazható.

Orvos általi felhasználás:

- Az Octicide nem alkalmazható műtét közben a hasüreg vagy a húgyhólyag átmosására.
- Az Octicide nem alkalmazható a dobhártyán.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Az Octicide alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.
- Az Octicide nem juthat be a véráramba, például a spray injekcióban történő véletlen beadása következtében.
- Ne lélegezze be a kipermetezett készítményt.
- A szöveti károsodás elkerülése érdekében a készítményt nem szabad nyomásnak kitett szöveten alkalmazni. Üreges sebek esetében gondoskodni kell a sebáladék elvezetéséről (például megfelelő, rugalmas drén behelyezésével). Az Octicide csak felületi alkalmazásra szolgál.
- Az Octicide véletlen szembe jutása kerülendő. Ha véletlenül a szembe kerül, haladéktalanul öblítse ki a szemet bő vízzel.
- Az Octicide okkluzív kötással együtt is alkalmazható.
- Egyéb mosószerekkel és tisztítószerrel való érintkezés kedvezőtlenül befolyásolhatja a készítmény hatékonyságát.

Gyermekek és serdülők

Az Octicide alkalmazható minden korcsoportban gyermekeknél és serdülőknél.

Az Octicide-t körültekintően kell alkalmazni újszülötteknél, különösen koraszülötteknél. Az Octicide súlyos bőrkárosodást okozhat. Távolítsa el a felesleges készítményt és gondoskodjon róla, hogy az oldat a szükségesnél hosszabb ideig ne maradjon a bőrön (beleértve a készítmény cseppjeit tartalmazó anyagokat is, amely közvetlenül érintkeznek a beteg bőrével).

C-160-257-17-RO-R6

Egyéb gyógyszerek és az Octicide

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről, beleértve az orvosi rendelvény nélkül kapható gyógyszereket is.

Az Octicide-t ne alkalmazza povidon-jód komplex alapú fertőtlenítőszerrel (antiszeptikumokkal) kezelt bőrfelület közelében, mivel a környező bőrfelületeken sötétbarna vagy lila színű elszíneződések alakulhatnak ki.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Terhesség

Az Octicide terhesség alatt történő alkalmazásával kapcsolatos, jelenleg rendelkezésre álló tapasztalatok nem igazoltak káros hatásokat.

Az Octicide elővigyázatosságból nem alkalmazható a terhesség első három hónapja során. A terhesség 4. hónapjával kezdődően a készítmény alkalmazható, ha szükséges.

Szoptatás

Nincsenek adatok az Octicide szoptatás alatt történő alkalmazásával kapcsolatban. Az Octicide nem alkalmazható szoptató anyák mellén.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Octicide nem vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. Hogyan kell alkalmazni az Octicide-t?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, illetve az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Az Octicide-t hígítás nélkül kell alkalmazni. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a sérülés után vagy a gyulladás első jeleit követően azonnal alkalmazza az Octicide-t.

Amennyiben a kezelőorvos másként nem rendelte, sebek vagy sérülések kezelése esetén vigye fel az Octicide-t az érintett területre naponta egyszer, legfeljebb 14 napig.

Az Octicide alkalmazásához többször nyomja le teljesen a mechanikus szórófejet mindaddig, amíg a teljes kezelendő terület nedvessé nem válik.

A kisebb sebeket általában nem igényelnek további lefedést, kötözést vagy sebtapaszzsal való fedést. A későbbi sebfertőzések megelőzése érdekében azonban ajánlott bekötözni a sebet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készítmény 1-2 perccel az alkalmazás után fejti ki teljes hatását, ezért várjon ennyi ideig, mielőtt valamilyen további beavatkozást végezne. Az Octicide maximális hatása az alkalmazásától számított 2 órán belül biztosított.

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét abban az esetben, ha a seb nem gyógyul megfelelően, vagy gyulladás jeleit tapasztalja (bőrpír, égő érzés vagy az alkalmazás helyén kialakuló duzzanat), illetve ha egyéb szövődmény lép fel a gyógyulás során. Ne alkalmazza ezt a gyógyszert 14 napnál tovább, anélkül, hogy orvossal megbeszélné.

Jelenleg kevés a tapasztalat a 14 napnál hosszabb ideig tartó folyamatos alkalmazásról, ezért az Octicide-t hosszabb ideig nem szabad alkalmazni.

Ha az előírtnál több Octicide-t alkalmazott

Túladagolásról nincsenek rendelkezésre álló adatok.

A készítmény előírásoknak megfelelő alkalmazása esetén a túladagolás nagyon valószínűtlen.

Ha további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez vagy a gondozását végző egészségügyi szakemberhez.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a készítmény is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az oktenidin-dihidrokloridot és fenoxietanolt tartalmazó készítménynél a következő mellékhatásokat figyelték meg:

Ritka (1000 beteg közül legfeljebb 1-et érinthet): égő érzés, bőrvörösség, viszketés vagy meleg érzet a kezelt területeken. Nagyon ritka (10 000 beteg közül legfeljebb 1-et érinthet): kontakt allergiás reakció.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a gondozását végző egészségügyi szakembert. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti a következő címre:

Nemzeti Népegészségügyi és

Gyógyszerészeti Központ

Postafiók 450

H-1372 Budapest

Honlap: www.nngyk.gov.hu

elektronikus úton történő mellékhatás-bejelentés:

<https://mellekhatas.nngyk.gov.hu>

e-mail: adr.box@nngyk.gov.hu

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Octicide-t tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik. Legfeljebb 30 °C-on tárolandó. A gyógyszer az első felnyitása után 12 hónapon belül, de a lejárati időn belül felhasználandó.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe, vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszerével. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Octicide?

A készítmény hatóanyaga oktenidin-dihidroklorid és fenoxietanol. 1 mg oktenidin-dihidrokloridot és 20 mg fenoxietanolt tartalmaz grammként.

Egyéb összetevők: 38%-os kokamidopropil-betain oldat (kokamidopropil-betaint, kókuszszírsavat, glicerint, vizet, nátrium-kloridot tartalmaz), nátrium-glükonát, 85%-os glicerint, 10%-os nátrium-hidroxid-oldat (pH beállításához), tisztított víz.

Milyen az Octicide külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Az Octicide szinte teljesen áttetsző és színtelen oldat fehér polietilén (HDPE) tartályban, polioxi-metilénből (POM), polietilénből (LDPE) és polipropilénből (PP) készült, rozsdamentes acélrugóval ellátott, fehér kézi szórófejjel. A dobozban 50 ml vagy 250 ml külsőleges oldatot tartalmazó tartály van.

A kiszerezés mérete 50 ml és 250 ml. Nem feltétlenül kerül mindegyik kiszerezés kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

ENE Pharmaceuticals s. r. o.

Pražská 442

281 67 Stříbrná Skalice

Csehország

Gyártó:

ARDEAPHARMA a. s.

Třeboňská 229

373 63 Ševětín

Csehország

Ezt a gyógyszert az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban az alábbi nevekkel engedélyezték:

Tagállam	A készítmény neve
Csehország	Octicide
Magyarország	Octicide
Románia	Octicide
Észtország	Octicide
Szlovákia	Octicide
Lengyelország	Help4Skin SEPTI-SPRAY

OGYI-T-23809/01 1x50 ml polietilén (HDPE) tartályban

OGYI-T-23809/02 1x250 ml polietilén (HDPE) tartályban

A betegtájékoztató legutóbbi

felülvizsgálatának dátuma: 2026. január

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g spray cutanat, soluție

diclorhidrat de octenidină/fenoxietanol



Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Octicide și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Octicide
3. Cum să utilizați Octicide
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Octicide
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Octicide și pentru ce se utilizează

Octicide este o soluție antiseptică (cu efect dezinfectant) pentru utilizare locală.

Se aplică pe mucoase și țesuturile învecinate înainte de procedurile chirurgicale în regiunea genitală externă și la nivelul organelor excretorii, la cateterizarea vezicii urinare, pentru tratamentul antiseptic repetat, de scurtă durată, pentru a distruge bacteriile și ciupercile și, de asemenea, pentru tratamentul antiseptic repetat, de scurtă durată, al rănilor. Nu utilizați Octicide mai mult de 14 zile.

Utilizare fără recomandarea unui medic:

Fără consultarea prealabilă a unui medic, Octicide poate fi utilizat pentru tratamentul antiseptic al rănilor superficiale la adulți, adolescenți și copii (cum sunt: abraziuni, zgârieturi, tăieturi/arsuri minore și pentru mușcăturile de insecte).

Utilizare doar conform recomandărilor medicului:

Tratamentul antiseptic temporar repetat al arsurilor și rănilor mai mari, spălarea antiseptică a vaginului și a colului uterin și dezinfectarea glandului penisului.

Utilizare medicală:

Tratamentul antiseptic al mucoaselor și al zonelor cutanate adiacente înainte de procedurile de diagnostic sau chirurgicale în regiunea genitală externă și a organelor excretorii, incluzând cateterizarea vezicii urinare și pentru tratamentul antiseptic repetat, de scurtă durată al rănilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Octicide**Nu utilizați Octicide:**

- dacă sunteți alergic la diclorhidrat de octenidină, fenoxietanol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6). Octicide nu trebuie aplicat direct în ochi.

Pentru medici:

- Octicide nu trebuie utilizat în timpul intervențiilor chirurgicale pentru clătirea cavității abdominale sau a vezicii urinare. Octicide nu trebuie aplicat la nivelul timpanului.

Atenționări și precauții

- Înainte să utilizați Octicide, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Evitați ca Octicide să treacă în sânge, de exemplu prin injectare accidentală. Nu inhalați aerosoli în timp ce pulverizați medicamentul.
- Pentru a evita leziunile la nivelul țesuturilor, medicamentul nu trebuie să fie aplicat pe țesut sub presiune. Drenajul soluției din cavitățile din răni trebuie să fie asigurat (de exemplu, cu o drenă flexibilă adecvată).
- Octicide este destinat doar aplicării la nivel superficial.
- Pătrunderea accidentală a Octicide în ochi trebuie evitată. În caz de contact accidental cu ochii, clătiți imediat ochii cu multă apă.
- Octicide poate fi utilizat în același timp cu bandajul ocluziv al plăgii.
- Contactul cu alte preparate de spălare și curățare poate avea efect negativ asupra eficacității medicamentului.

Copii și adolescenți

Octicide poate fi folosit de copii și adolescenți. Octicide trebuie utilizat cu precauție la nou-născuți, în special la cei născuți prematur. Octicide poate provoca efecte grave asupra pielii. Îndepărtați cantitatea de medicament în exces și asigurați-vă că soluția nu rămâne pe piele mai mult decât este necesar (inclusiv materialele cu picături de soluție, aflate în contact direct cu pielea pacientului).

Octicide împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat, recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente obținute fără rețetă.

Nu utilizați Octicide în apropierea pielii tratate cu antiseptice (compuși cu efecte dezinfectante) pe bază de complex de iod-providonă, deoarece pot apărea modificări de culoare de la brun închis până la violet.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, discutați medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Experiența actuală privind utilizarea Octicide în timpul sarcinii la oameni nu indică niciun efect periculos.

Ca măsură de precauție, nu utilizați Octicide în timpul primei luni de sarcină. Din a 4-a lună de sarcină, medicamentul poate fi utilizat, dacă este necesar.

Alăptarea

Nu există date despre utilizarea Octicide în timpul alăptării.

Octicide nu trebuie utilizat în zona sânilor la mamele care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Octicide nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Octicide

Utilizați întotdeauna acest medicament exact în conformitate cu acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Octicide este utilizat nediluat. Cele mai bune rezultate se obțin prin aplicarea imediat după producerea unei leziuni sau la primele semne de inflamație.

În absența altor indicații din partea medicului, pentru tratamentul rănilor și leziunilor, aplicați Octicide o dată pe zi în zona afectată, timp de maximum 14 zile.

Aplicați Octicide pe zona afectată prin apăsarea fermă, repetată a pulverizatorului mecanic, până la umezirea completă a zonei afectate.

De obicei, rănilor minore nu necesită acoperire suplimentară, un pansament sau plasturi. Cu toate acestea, pentru a preveni infectarea ulterioară a rănilor, se recomandă să acoperiți rana cu un bandaj.

Rețineți că efectul complet al medicamentului nu va fi observat decât după 1-2 minute după aplicare, așadar respectați acest timp înainte de efectuarea oricăror alte proceduri suplimentare. Efectul maxim al Octicide este obținut în decurs de 2 ore după aplicare.

Adesași-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului în cazul în care rana nu se vindecă corespunzător sau prezintă semne de inflamație (înroșire, arsură, umflare în zona de aplicare) sau se observă alte complicații în timpul vindecării. Nu utilizați acest medicament mai mult de 14 zile fără să fiți consultat de un medic.

Până în prezent, este disponibilă o experiență limitată de utilizare continuă timp de maximum 14 zile, prin urmare, Octicide nu trebuie utilizat mai mult decât această perioadă.

Dacă utilizați mai mult Octicide decât trebuie

Nu există date disponibile despre supradozaj. Când utilizați medicamentul conform instrucțiunilor, supradozajul cu Octicide este extrem de puțin probabil. Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Următoarele reacții adverse au fost observate la medicamentul care conține diclorhidrat de octenidină și fenoxietanol:

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane):

Arsură, roșeață, mâncărime sau senzație de căldură la locul de administrare.

Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 de persoane):
Reacții alergice de contact.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Octicide

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30 °C.

După prima deschidere, Octicide trebuie utilizat în decurs de 12 luni, dar nu după data de expirare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALĂ PUBLICE SAU PRIVATE.

6. Conținutul ambalajului și alte informații**Ce conține Octicide**

• Substanțele active sunt diclorhidrat de octenidină și fenoxietanol. Un gram de spray cutanat, soluție conține 1 mg diclorhidrat de octenidină și 20 mg de fenoxietanol.

Celelalte componente sunt: cocamidopropil betaină soluție 38% (conține cocamidopropil betaină, acid gras din nucă de cocos, glicerină, apă, clorură de sodiu), gluconat de sodiu, glicerol 85%, soluție de hidroxid de sodiu 10%, apă purificată.

Cum arată Octicide și conținutul ambalajului

Octicide este o soluție limpede, slab opalescentă, aproape incoloră, disponibilă într-un flacon alb din polietilenă de înaltă densitate (PEID), prevăzut cu o pompă albă manuală din polioximetilenă (POM), polietilenă de joasă densitate (PEJD) și polipropilenă (PP), cu un arc din oțel inoxidabil, ambalat într-o cutie pliabilă, care conține 50 ml sau 250 ml soluție cutanată. Mărimile de ambalaj sunt de 50 ml și 250 ml.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**Deținătorul autorizației de punere pe piață:**

ENEOPHARMACEUTICALS S. R. O.

Pražská 442

281 67 Stříbrná Skalice

Cehia

Fabricantul:

ARDEAPHARMA a. s.

Tréboňská 229

373 63 Ševětín

Cehia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European, sub următoarele denumiri comerciale:

Stat Membru	Denumire medicament
Cehia	Octicide
Ungaria	Octicide
România	Octicide
Estonia	Octicide
Slovacia	Octicide
Polonia	Help4Skin SEPTI-SPRAY

Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2026.

