Pakendi infoleht: teave kasutajale

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g nahasprei, lahus

oktenidiindivesinikkloriid/fenoksüetanool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist
3. Kuidas Octicidet kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Octicidet säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse

Octicide on antiseptiline lahus (desinfektant) paikseks kasutamiseks. Seda kasutatakse lühiajaliselt bakterite ja seente hävitamiseks limaskestadele ja nendega piirnevale nahale manustamisega enne kirurgilisi protseduure väliste sugu- ja erituselundite piirkonnas ning uriinikateetri paigaldamist, samuti haavade korduvaks lühiajaliseks antiseptiliseks raviks.
Octicidet tohib kasutada kuni 14 päeva.

Kasutamine ilma arsti ettekirjutuseta
Ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata võib Octicidet kasutada pindmiste haavade (nt marrastused, kriimustused, väikesed sisselõiked, põletused ja putukahammustused) antiseptiliseks raviks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel.

Kasutamine ainult arsti ettekirjutuse alusel
Lühiajaliselt korduvaks põletuste ja suuremate haavade antiseptiliseks raviks, vaginaalseks ja emakakaela antiseptiliseks raviks ning peenise pea desinfitseerimiseks.

Meditsiiniline kasutus
Limaskestade ja nendega piirneva naha antiseptiliseks raviks enne diagnostilisi või kirurgilisi protseduure väliste sugu- ja erituselundite ümbruses ja uriinikateetri paigaldamist ning samuti haavade korduvaks lühiajaliseks antiseptiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist

Octicidet ei tohi kasutada
- kui olete oktenidiindivesinikkloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- Ravimit ei tohi kasutada silmas.

Arstidele
Octicidet ei tohi kasutada operatsiooni ajal kõhuõõne või põie loputamiseks.
Octicidet ei tohi manustada kuulmekilele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- Enne Octicide kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Vältige Octicide sattumist vereringesse, nt sprei tahtmatu süstimisega.
  Ärge hingake pihustamise ajal sisse.
- Kudede kahjustuse vältimiseks ei tohi seda ravimit manustada surve all. Tuleb tagada lahuse drenaaž haavade õõnsustest (nt sobiva painduva dreeni abil). Octicide on ettenähtud ainult pinnale kandmiseks.
- Octicide sattumist silma tuleb vältida. Juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi kohe loputada rohke veega.
- Octicidet tohib kasutada oklusiivsel sidumisel.
- Kokkupuude teiste pesu- ja puhastusvahenditega võib muuta Octicide ebaefektiivseks.

Lapsed ja noorukid
Octicidet võib kasutada lastel ja noorukitel. Octicidet tuleb vastsündinutel, eriti enneaegsetel imikutel kasutada ettevaatusega. Octicide võib põhjustada tõsiseid nahakahjustusi. Eemaldage liigne lahus ja veenduge, et lahus ei jääks nahale kauemaks kui vaja (kaasa arvatud materjalid, millel on lahuse tilgad, mis on otseses kokkupuutes patsiendi nahaga).

Muud ravimid ja Octicide
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimeid.

Ärge kasutage Octicidet nahapiirkonna lähedal, mida on töödeldud povidoon-joodil põhinevate antiseptikumidega (desinfektandid), sest nahk võib kokkupuutekohal värvuda tumepruuniks või lillaks.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Senised kogemused Octicide kasutamisega raseduse ajal ei viita kahjulikule toimele.

Ettevaatusena ärge kasutage Octicidet esimese kolme raseduskuu jooksul. Alates neljandast raseduskuust võib Octicidet kasutada vajadusel.

Imetamine
Puuduvad andmed Octicide kasutamise kohta imetamise ajal. Octicidet ei tohi kasutada imetavatel emadel rinna piirkonnas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Octicide ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Octicidet kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Octicidet kasutatakse lahjendamata. Parem tulemus saavutatakse manustamisel kohe pärast vigastust või esmaste põletikunähtude ilmnemisel.

Kui arst ei ole määranud teisiti, manustage Octicidet haavade ja vigastuste raviks kahjustatud piirkonnale üks kord ööpäevas, mitte kauem kui 14 päeva.

Manustage Octicidet mehhaanilise pihusti korduva vajutamisega, nii et kogu ravitav piirkond on täielikult niisutatud.

Väikeste vigastuste korral ei ole täiendav katmine, sideme või plaastri paigaldamine tavaliselt vajalik. Siiski, et vältida haava hilisemat saastumist, on soovitatav haav katta sidemega.

Pidage meeles, et toote täielik toime tekib alles 1...2 minutit pärast manustamist, nii et oodake nii kaua enne edasiste protseduuridega jätkamist. Octicide maksimaalne toime on tagatud kuni 2 tunni jooksul pärast manustamist.

Kui haav ei parane korralikult, sellel esineb põletiku sümptomeid (punetus, põletustunne, paistetus manustamiskohas) või kui te täheldate ravi ajal muid tüsistusi, teatage sellest oma arstile või apteekrile.
Ärge kasutage seda ravimpreparaati ilma arstiga nõu pidamata kauem kui 14 päeva.

Octicide korduva manustamise kogemused piirnevad 14 päevaga, seega ei tohi seda ravimit kasutada sellest pikema aja jooksul.

Kui te kasutate Octicidet rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise kohta andmed puuduvad. Octicide kasutamisel vastavalt juhistele on üleannustamine äärmiselt ebatõenäoline.
Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Oktenidiindivesinikkloriidi ja fenoksüetanooli sisaldava ravimi kasutamisel on täheldatud järgmiste kõrvaltoimete teket.

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):
põletus, punetus, sügelus või kuumatunne manustamiskohas.

Väga harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st):
kontaktallergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Octicidet säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pärast esmast avamist tuleb Octicide ära kasutada 12 kuu jooksul, kuid mitte pärast kõlblikkusaja lõppemist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Octicide sisaldab
- Toimeained on oktenidiindivesinikkloriid ja fenoksüetanool. 1 g lahust sisaldab 1 mg oktenidiindivesinikkloriidi ja 20 mg fenoksüetanooli.
- Teised koostisosad on kokamidopropüülbetaiini 38% lahus (sisaldab kokamidopropüülbetaiini, kookospähkli rasvhappeid, glütseriini, vett, naatriumkloriidi), naatriumglükonaat, 85% glütserool, 10% naatriumhüdroksiidi lahus (pH reguleerimiseks), puhastatud vesi.

Kuidas Octicide välja näeb ja pakendi sisu
Octicide on selge, kergelt läbipaistev, peaaegu värvitu lahus, mis on saadaval 50 ml (50 g) või 250 ml (250 g) nahalahust sisaldavates valgetes polüetüleenist (HDPE) pudelites, millel on valge polüoksümetüleenist (POM), polüetüleenist (LDPE) ja polüpropüleenist (PP) mehhaaniline roostevabast terasest vedruga pihustuspump ning mis on pakendatud pappkarpi.
Pakendi suurused on 50 ml ja 250 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Tšehhi

Tootja
ARDEAPHARMA a. s.
Třeboňská 229
373 63 Ševětín
Tšehhi

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2026.